

The effect of plant density and Ethyphon in corn crop

تأثير المسافات بين السطور والاثيفون في محصول الذرة الصفراء

احمد محمد لهماود
زهراء حيدر خضير
الكلية التقنية/المسيب

الخلاصة

اجريت تجربة حقلية خلال الموسمين الربيعي والخريفي (2014) في المزرعة الارشادية بمنطقة (سدة الهندية ، المهناوية) التابعة لمحافظة بابل بهدف دراسة تأثير المسافات بين السطور وتراكيز الاثيفون في نمو وحاصل الذرة الصفراء في تربة نفدت تجربة عاملية وفق تصميم القطاعات الكاملة المعشاة وكان العامل الاول الكثافة النباتية (40- 55 - 70) سم اما العامل الثاني فكان تراكيز الاثيفون (0 - 280 - 420 - 560) غرام /هكتار وكانت النتائج هي وجود اختلاف معنوي بين الكثافات النباتية ومستويات الاثيفون على الصفات المدروسة. تفوقت المسافة بين السطور (70)سم باعطائها اعلى القيم لصفة المساحة الورقية اذ بلغت (0.317 و 0.460) م² ولصفة وزن حبة اذ بلغت (136.39، 161.72)غم للموسمين الخريفي والربيعي على الترتيب. اما بالنسبة لصفة عدد الحبوب بالعرنوص فقد تفوقت المسافة بين السطور (55)سم باعطائها اعلى معدل للصفة بلغ (579)حبة/عرنوص للموسم الربيعي، اما بالنسبة للموسم الخريفي فقد تفوقت المسافة بين السطور (40)سم باعطائها اعلى معدل للصفة ذاتها اذ بلغت (645)حبة/عرنوص. اما بالنسبة لصفة حاصل النبات فقد تفوقت المسافة بين السطور (70) سم باعطائها اعلى معدل للصفة اذ بلغ (263.26 و 267.10)غم للموسمين على الترتيب اما نسبة البروتين فقد تفوقت المسافة بين السطور ذاتها باعطائها اعلى المعدلات اذ بلغت (9.33، 10.12)% ولكلا الموسمين على الترتيب. اما بالنسبة لمستويات الاثيفون فحقق المستوى الاول (0)غم اعلى المعدلات للصفات : المساحة الورقية ،وزن 500 حبة، عدد الحبوب/عرنوص ،حاصل النبات،نسبة البروتين في الحبوب اذ بلغت (0.390 ، 0.426)م² (138.67، 163.14)غم (571.66، 640.0)حبة/عرنوص (260.09 و 266.50)غم (9.00 و 9.88)% للموسمين الربيعي والخريفي على الترتيب اما التداخل بين المسافات بين السطور ومستويات الاثيفون فكان معنويا للصفات: المساحة الورقية-وزن 500 حبة_حاصل النبات ولم يكن التداخل معنويا للصفات: عدد الحبوب/العرنوص_ونسبة البروتين في الحبوب.

الكلمات المفتاحية : الذرة الصفراء، الاثيفون، المسافات بين السطور، تداخل

Abstract :

A field experiment was carried out at the center of training agricultural Al-mahanawia Babil during spring and autumn seasons of 2014 to study the effect of the plant density and ethyphon concentration in growth and grains yield of corn soil. The experiment was done with factorial experiment arrangement by (RCBD) the first factor was agriculture density between the rows (40 , 55 ,70)cm . The second factor was the concentrations' of ethyphon (0 - 280-420 - 560) gram/he . The results revealed a significant differences among the plant density and ethyphon concentration for all study traits the density between rows (70)cm by giving high value for leaf area (0.317,0.460)m² and at 500 grain weigh (136.39,161,72)g for both seasons spring and autumn respectively .while the number of grain /ear trait the density between the rows (55)was succeeded by giving high rang (579)grain/ear for spring season .in other hand the density between rows (40)cm was succeeded by giving high rang (645) grain /ear at autumn season. but the density between rows (70)cm was succeeded at the grain yield trait(263.26,267.10)g for both season spring and autumn sequentially .when the protein ratio ,the same density between rows was succeeded by giving a high rang (9.33,10.12)%for both season spring and autumn sequentially. while the level of ethyphon (0)g/he level gave high ranges for the flowing traits:- leaf area,500 grain weight,number of grain/ear,grain yield, protein ratio of grains. (0.390,0.426)m², (138,67,163.14)g , (571.60,640.0) grain/ear (260.09,266.50)g and (9.0,9.88)%for both season spring and autumn sequentially.the interference between the density and the ethyphon levels was significant for traits:leaf area,500 grain weight,grain yield,but the difference were no significant for both traits:number of grains/ear and protien ratio in grains.

Key words: maize , ethyphon , density between rows, interference

المقدمة

يعد محصول الذرة الصفراء (*Zea mays* L) من المحاصيل الاقتصادية لاستخداماته المتعددة وبكافه اجزائه الخضرية والتمريه، فأجزائه الخضرية تعد علفا بحالتيه الاخضر والسيلج اما بذوره فتستخدم في الطعام كطحين للخبز بعد ان تخلط مع طحين الحنطة.

وتستخدم كعليقه حيوانيه مركزه لاحتوائها على الكربوهيدرات والبروتين والزيت والرماد وبعض المعادن الاخرى كالصوديوم والبوتاسيوم فضلا عن احتواء حبوبها على فيتامين E, B₁, B₂, B₁₂ (1). ويمكن استخدام سيقانها لصناعة الورق ومن بذوره تستخرج ارقى انواع الزيوت والنشأ وبكميات كبيره (2) اما من ناحيه الانتاج فيحتل المحصول المركز الثاني بعد الحنطة عالميا من حيث المساحة المزروعه وبلغت المساحة المزروعه في العالم لعام 2012 مايقارب (182) مليون هكتار وانتجت مايقارب (824) مليون طن (3) اما على مستوى العراق فكانت المساحة المزروعه (117.006) الف هكتار وانتجت مايقارب (267) الف طن وبمعدل (2282) كغم/هكتار (4) وهذا يعني تدني واضح في الانتاج لوحده المساحة مما دفع المهتمين بالشأن الزراعي الاهتمام بزراعه هذا المحصول افقيا وعموديا افقيا بتوسيع المساحات المزروعه وعموديا باستخدام الاساليب الحديثه وادخالها في تجارب زراعيه لغرض الحصول على اعلى حاصل منها اضافة الاثيفون بتركيز مختلفه وهذا بدوره يعمل على معالجة ظاهره الاضطجاع في الكثافات العاليه ويكون اكثر ملائمه للالات الحديثه في الحصاد.

وتعد الكثافه عاملا محددا للانتاج واد ذلك (5) بتجربته على ان الكثافه المثلى 53333 نبات/هكتار وان زياده الكثافه النباتيه اكثر من ذلك قللت الانتاج لانه اثر بشكل واضح على المساحة الورقيه .

لما تقدم فقد اجري هذا البحث لغرض:

- 1- دراسة تأثير مسافات الزراعه بين السطور والتركيز المختلف من الاثيفون على حاصل ونوعية الذره الصفراء تحت ظروف محافظة بابل
- 2- معرفة افضل تداخل بين المسافات بين السطور وتركيز الاثيفون في نمو وحاصل الذره الصفراء والصفات النوعيه.

المواد وطرائق العمل :

أجريت هذه الدراسة خلال الموسمين الربيعي والخريفي لعام 2014 في المزرعة الإرشادية بمنطقة (سدة الهندية / المهناوية) التابعة لمحافظة بابل. زرعت بذور الصنف (مها) بتاريخ 2014/3/28 و 2014/7/25 حيث تم اعداد الارض اعدادا صحيحا من حرثه وتنعيم وتسويه وتميز حيث زرعت البذور بواقع ثلاث مكررات واستخدم السماد الفوسفاتي P₂O₅ بواقع 200 كغم/هكتار اثناء اعداد التربه للزراعه واذيف سمد اليوريا (46% N) بواقع 320 كغم/هكتار بواقع دفعتين الاولى بعد اسبوع من الانبات والثانيه عند بدايه ظهور الحريه . رش الحقل بمبيد الاترازين (80% ماده فعاله) بواقع 4 كغم/هكتار لمكافحة الادغال مع الاستمرار بالتعشيب كلما دعت الحاجه لذلك وتمت مكافحة حفار ساق الذره بالاستعمال الديازنون المحبب (10% ماده فعاله) بمعدل 6 كغم/هكتار وذلك بتلقيح النباتات على دفعتين الاولى بعد 20 يوم من الزراعه والثانيه بعد اسبوعين من المكافحه الاولى وقد استعملت تجربه عاملية وفق تصميم القطاعات الكامله المعشاة حيث كان العامل الاول الكثافات النباتية والتي تشمل (40 - 55 - 70) سم بين خط وآخر والمسافة بين نبات وآخر (25 سم) والعامل الثاني الاثيفون بتركيز (0 - 280 - 420 - 560) غرام / هكتار من انتاج شركة A.O.A.N في U.S.A حيث تمت اضافه الاثيفون بواسطة مرشة ظهرية سعة (10) لتر وكان عدد الغرامات المذابه في (10) لتر هي (0-7-10.5-14) غم) على الترتيب وكانت الاضافه رشاً على النباتات في الصباح الباكر لتلافي ارتفاع درجات الحراره وتبخر المحلول وجرت معاملات الرش بعد عملية السقي بيوم واحد ولكلا الموسمين لزيادة كفاءة النباتات في امتصاص المحلول المغذي.

ودرس بعض الصفات للذره الصفراء ومدى تأثيرها بالعاملين المدروسين وهما مسافات الزراعه وتركيز الاثيفون وهي :-

- 1- المساحة الورقية (م2)
حسب من خلال أخذ قراءات لـ 10 نباتات عشوائية من الخططين الوسطيين وفق المعادلة التالية:
المساحة الورقية = مربع طول الورقة تحت ورقة العرنوص $\times 0.75$ (6)
- 2- وزن 500 حبة (غم)
بعد تقريط العرانيص لعشرة نباتات وأخذ عينة عشوائية من حبوبها تم زنة 500 حبة منها .
- 3- عدد الحبوب / العرنوص
حسب كمعدل لعشرة عرانيص أخذت عشوائيا .
- 4- حاصل النبات الواحد .
تم بقسمة حاصل النباتات العشرة على عددها بعد تعديل نسبة الرطوبة للحبوب الى 15.50 %
- 5- نسبة البروتين في الحبوب
قدرت النسبة المئوية للبروتين في الحبوب حيث أخذت (0.2) غم من النماذج وهضمت باستعمال حامض الكبريتيك المركز والبيروكلوريك المركز بنسبة 1:4 (بجهاز كدال Kjeldahl) وقدر النتروجين بالتسحيح مع هيدروكسيد الصوديوم تركيزه 40% وأجريت له عملية التقطير وجمعت الامونيا المتحررة في بيكر حاوي على 25 مل من حامض البوريك 2% مع قطرتين من خليط دلائل (Bromocal Green Methly Red) المذابتان بالايثانول ثم سححت مع حامض HCl عياري 0.01 (13) وتم التحليل في مختبر التغذية التابع إلى الإنتاج الحيواني / الكلية التقنية / المسيب للعبوة الربيعية والخريفية ، واستعمل طريقة Kjeldahl لتقدير النسبة المئوية للنتروجين ثم حسبت النسبة المئوية للبروتين وكما يلي :

$$\text{البروتين (\%)} = \text{نسبة النتروجين} \times 6.25 \quad (7)$$

النتائج والمناقشة

1- المساحة الورقية (م²)

هي مقياس لمقدرة النبات على البناء الضوئي وبزاداتها يزداد البناء الضوئي لاعتراضها معظم الاشعاع الساقط (8) تؤدي زياده المساحة الورقيه وضمن حدود معينه الى زيادة اعتراضها لاشعة الشمس وبالتالي زيادة كفاءه التمثيل الضوئي وهذا بدوره يؤدي الى زيادة حاصل النبات.

ففي الموسم الربيعي يبين الجدول (1) وجود فروقات معنويه بين الكثافات النباتيه ومستويات الاثيفون والتداخل بينهما لصفة المساحة الورقيه وكذلك الموسم الخريفي .

اذ اعطت المسافة بين السطور (70) سم اعلى معدل للصفه بلغت (0.317، 0.460) م² ولكلا الموسمين الربيعي والخريفي على الترتيب وحقت الكثافه المسافة بين السطور (40) سم او طامعدل للصفه بلغت (0.249 و 0.335) ولكلا الموسمين الربيعي والخريفي على الترتيب وذلك لأن في الكثافه (70) سم يحصل النبات على كفايته من الماء والعناصر الغذائيه لقله المنافسه وهذه النتائج تتفق مع (9) اما في حالة (40) سم فالمنافسه تكون في اعلى درجاتها وبالتالي لا يحصل النبات على كفايته من الماء والمواد الغذائيه وهذا يترك اثره على المساحة الورقيه .

اما بالنسبة لمستويات الاثيفون نجد ان المستوى الاول (0) غم / هكتار قد حقق اعلى معدل للصفه بلغت (0.390 و 0.426) م² للموسمين الربيعي والخريفي على الترتيب وذلك لأن النبات كان طبيعيا في ارتفاعه فقد استلم ما يحتاجه من اشعة الشمس وبهذا فكانت عمله التمثيل الضوئي اكفاً واسرع من التنفس ولهذا كان البناء اعظم من الهدم وتتفق هذه النتائج مع (10)، وانعكست الحاله عند المستوى (560) للاثيفون فاعطى او طامساحه ورقيه وذلك لحدوث العكس اذ بلغت (0.245 و 0.354) م² للموسمين الربيعي والخريفي على الترتيب .

اما التداخل بين المسافات بين السطور ومستويات الاثيفون وتأثيرها على صفة المساحة الورقيه فكان معنوياً وكان افضل تداخل للمعامله عند المسافة (70) سم ومستوى الاثيفون (0) غم / هكتار اذ بلغت 0.461 و 0.486 م² ولكلا الموسمين الربيعي والخريفي على الترتيب واقل قيمه عند المسافة (40) سم ومستوى الاثيفون (560) اذ بلغت 0.209 و 0.288 م² ولكلا الموسمين الربيعي والخريفي على الترتيب.

جدول (1) تأثير المسافات بين السطور ومستويات الاثيفون على المساحة الورقية (م²) للموسمين الربيعي والخريفي

الموسم الخريفي					الموسم الربيعي				
الكثافات النباتية				مستويات الاثيفون	الكثافات النباتية a				مستويات الاثيفون b
المعدل	70	55	40		المعدل	70	55	40	
0.426	0.486	0.420	0.372	0	0.390	0.461	0.375	0.335	0
0.408	0.477	0.388	0.360	280	0.325	0.426	0.320	0.230	280
0.380	0.458	0.361	0.322	420	0.298	0.320	0.291	0.225	420
0.354	0.419	0.327	0.286	560	0.245	0.280	0.218	0.209	560
/	0.460	0.381	0.355	المعدل	/	0.317	0.308	0.249	المعدل
L.S.D a		L.S.D b		L.S.D ab	L.S.D a		L.S.D b		L.S.D ab
0.0467		0.033		0.0321	0.044		0.0384		0.0398

a=الكثافة

b= الاثيفون

L.S.D=0.05

2- وزن (500) حبة :-

ان صفة وزن 500 حبه من مكونات الحاصل الرئيسي في نبات الذرة الصفراء حيث ترتبط بعملية التركيب الضوئي والتي تعتمد هي الاخرى بدورها على المساحة الورقية وزاويتها وتوزيعها على الساق وبكفائه نقل المواد المصنعه وكفائه قوه جذب المصب وبالتالي يعتمد وزن الحبه على مدخلات النمو (11)

يتضح من الجدول (2) وجود فروقات معنويه للكثافات النباتيه ومستويات الاثيفون لصفة وزن 500 حبه حيث تميزت الكثافه الثالثه (70) سم باعطاء اعلى قيمه لوزن 500 حبه بلغت (136.39 و 161.72) غم للموسمين الربيعي والخريفي على الترتيب يعزى سبب ذلك الى قلة التنافس بين النباتات على متطلبات النمو تتفق هذه النتائج مع (12)

اما بالنسبه لمستويات الاثيفون فقد اعطى المستوى (0) غم/هكتار اعلى قيمه بلغت (138.67 و 163.14) غم للموسمين الربيعي والخريفي على الترتيب وتتفق هذه النتائج مع (13).

وقد حقق التداخل بين الكثافه النباتيه ومستويات الاثيفون فروقا معنويه للصفه فقد حققت الصفه اعلى قيمه بلغت (145.63 و 184.57) غم عند الكثافه النباتيه الثالثه (70) سم ومستوى الاثيفون (0) غم/هكتار للموسمين الربيعي والخريفي على الترتيب.

جدول (2) تأثير الكثافة النباتية والاثيفون والتداخل بينهم في وزن 500 حبة (غم) لمحصول الذرة الصفراء

الموسم الخريفي					الموسم الربيعي				
الكثافات النباتية				مستويات الاثيفون	الكثافات النباتية a				مستويات الاثيفون b
المعدل	70	55	40		المعدل	70	55	40	
163.14	184.57	159.10	145.77	0	138.67	145.63	138.77	131.63	0
148.06	176.00	138.13	130.07	280	131.06	139.62	130.38	123.20	280
132.91	150.13	127.77	120.83	420	124.47	133.74	121.27	118.41	420
123.46	136.20	119.20	115.00	560	116.21	126.55	114.53	107.85	560
/	161.72	136.05	127.91	المعدل	/	136.39	126.24	120.19	المعدل
L.S.D a		L.S.D b		L.S.D ab	L.S.D a		L.S.D b		L.S.D ab
4.665		4.040		8.079	3.527		4.073		5.054

a= الكثافة

b= الاثيفون

L.S.D=0.05

3- عدد الحبوب / العرنوص

تعد عدد الحبوب / العرنوص من المكونات الاساسيه لحاصل النبات في محصول الذرة الصفراء (14) يبين الجدول (3) وجود فروقات عاليه المعنويه للكثافات النباتيه ولمستويات الاثيفون لصفه عدد الحبوب / عرنوص وعدم وجود تداخل معنوي بينهما. حيث تميزت المسافة بين السطور (55) سم باعطاء اعلى معدل لصفة عدد الحبوب / العرنوص بلغ (579) حبه / عرنوص للموسم الربيعي تتفق هذه النتائج مع (15) اما اعلى عدد حبوب/ عرنوص في الموسم الخريفي فكان عند المسافة بين السطور (40) سم اذ بلغ (645) حبه/ عرنوص . اما بالنسبه لمستويات الاثيفون فقد اعطى المستوى (0) غم/هكتار اعلى معدل للصفه بلغ (571.66 و 640.00) حبه/ عرنوص للموسمين الربيعي والخريفي على الترتيب. ولم تكن هنالك فروقات معنويه للتداخل بين الكثافات النباتيه ومستويات الاثيفون على صفة عدد الحبوب/ عرنوص بالرغم من وجود بعض الفروقات الا انها لم تكن معنويه على الصفه .

جدول (3) تأثير الكثافات النباتية ومستويات الاثيفون في عدد الحبوب/العنوص لمحصول الذرة الصفراء

الموسم الخريفي					الموسم الربيعي				
الكثافات النباتية				مستويات الاثيفون	الكثافات النباتية a				مستويات الاثيفون b
المعدل	70	55	40		المعدل	70	55	40	
640.0	601	632	687	0	571.66	545	602	568	0
623.33	587	620	663	280	558.33	533	583	559	280
599.33	573	598	627	420	546.66	519	570	551	420
579	555	679	603	560	532.33	499	561	537	560
	580	607.25	645	المعدل		524	579	554	المعدل
L.S.DA	L.S.DB		L.S.DAB		L.SDA	L.S.DB		L.S.DAB	
25.3	20.9		N.S		21.4	12.4		N.S	

A=الكثافة

B= الاثيفون

L.S.D=0.05

4- حاصل النبات الواحد (غم)

تعد صفة حاصل النبات من الصفات الكمية المعقدة فهي المرحلة النهائية لمكونات الحاصل وهي من الصفات التي يصعب مربيو النبات الحصول عليها وبأكبر القيم وبالتالي لها أكبر الأثر من الناحية الاقتصادية ، وهذه الصفة هي دالة لمكوناته الرئيسية(16)، يتضح من الجدول (4) وجود فروقات معنوية للكثافات النباتية ولمستويات الاثيفون والتداخل بينها لصفة حاصل النبات.

حيث تميزت المسافة بين السطور (70) سم بأعطائها أعلى معدل للصفة (267.10 و 263.26) غم في الموسمين الربيعي والخريفي على الترتيب تتفق هذه النتائج مع(17).

أما بالنسبة لمستويات الاثيفون فقد حقق المستوى (0) غم/هكتار أعلى حاصل للنبات إذ بلغ

(266.50 و 260.09) غم للموسمين الربيعي والخريفي على الترتيب .

وقد حقق التداخل بين الكثافات النباتية ومستويات الاثيفون فروقات معنوية لصفة حاصل النبات وقد كان أعلى تداخل للصفة

عند السافة (70) سم ومستوى الاثيفون (0) غم/هكتار إذ بلغ (286.40 و 291.00) غم للموسمين على الترتيب .

جدول (4) تأثير الكثافة النباتية والاثيفون في حاصل النبات (غم) لمحصول الذرة الصفراء

الموسم الخريفي					الموسم الربيعي				
الكثافات النباتية				مستويات الاثيفون	الكثافات النباتية a				مستويات الاثيفون b
المعدل	70	55	40		المعدل	70	55	40	
266.50	291.00	267.47	241.00	0	260.09	286.40	259.67	234.20	0
250.71	276.13	246.00	228.00	280	246.55	269.80	244.67	225.17	280
233.68	266.13	223.47	211.43	420	231.45	253.13	231.20	210.00	420
211.29	233.17	208.47	192.23	560	220.75	243.73	217.47	201.03	560
	267.10	236.35	218.16	المعدل		263.26	238.25	217.75	المعدل
L.S.D a		L.S.D b		L.S.D ab	L.S.D a		L.S.D b		L.S.D ab
3.971		4.586		7.943	3.824		4.416		7.649

a= الكثافة

b= الاثيفون

L.S.D=0.05

5- نسبة البروتين في الحبوب (%)

تعد نسبة البروتين من المكونات الرئيسية في حبوب الذرة الصفراء وعند قلة الكثافة النباتية تزداد نسبة البروتين لأن النبات يأخذ كفايته من أشعة الشمس والماء والغذاء (18) .

يتضح من الجدول (5) أن هناك فروقاً عالية المعنوية في الكثافات النباتية ومستويات الاثيفون على صفة نسبة البروتين في محصول الذرة الصفراء إلا أنه لم تكن هنالك فروقاً معنوية للتداخل بين العاملين على الصفة فيتضح أن المسافة بين السطور (70) سم أعطت أعلى نسبة بروتين في حبوب الذرة الصفراء إذ بلغت (9.33 و 10.12) % للموسمين على الترتيب تتفق هذه النتائج مع (19).

في حين أعطت الكثافة النباتية (40) سم أوطأ نسبة بروتين (8.28 و 9.15) % للموسمين الربيعي والخريفي على الترتيب ، أما بالنسبة لمستويات الاثيفون فقد حقق المستوى (0) غم /هكتار أعلى معدل للصفة (9.00 و 9.88) % للموسمين الربيعي والخريفي على الترتيب .

أما التداخل بين المسافات بين السطور ومستوى الاثيفون بالرغم من حصول فروقات بين القيم إلا أنها لم تكن معنوية على صفة نسبة البروتين وللموسمين الربيعي والخريفي.

جدول (5) تأثير الكثافة النباتية والاثيفون في محتوى الحبوب من البروتين % لمحصول الذرة الصفراء

الموسم الخريفي					الموسم الربيعي				
الكثافات النباتية				مستويات الاثيفون	الكثافات النباتية a				مستويات الاثيفون b
المعدل	70	55	40		المعدل	70	55	40	
9.88	10.40	9.84	9.42	0	9.00	9.60	8.89	8.50	0
9.62	10.20	9.47	9.21	280	8.82	9.41	8.71	8.33	280
9.47	10.10	9.23	9.09	420	8.66	9.22	8.59	8.19	420
9.23	9.81	9.03	8.86	560	8.52	9.12	8.38	8.08	560
	10.12	9.40	9.15	المعدل		9.33	8.64	8.28	المعدل
L.S.D a	L.S.D b		L.S.D ab		L.S.D a	L.S.D b		L.S.D ab	
0.272	0.351		N.S		0.067	0.181		N.S	

a= الكثافة b= الاثيفون L.S.D=0.05

المصادر :-

- 1-النصراوي ، عبد الكريم حسين رومي . (2015) تقييم استجابة التراكيب الوراثية للذرة الصفراء (*Zea mays L*)المنتجة بالتهجين الوراثي التبادلي وابائها للتسميد النتروجيني. أطروحة دكتوراه ، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة كربلاء.
- 2- إبراهيم ، محمد فؤاد و بطرس غالي وحسن فوزي وحسن ماهر ومحمد جمال الدين قذري. 1986. موسوعة المعرفة ، المجلد 18، شركة مراد كسيم ، مطبعة داغر ، لبنان.
- 3-F.A.O. .2012. <http://www.fao.org/site/5671.default.ancar>.
- 4- المنظمة العربية للتنمية الزراعية. 2011. الكتاب السنوي للاحصاءات الزراعية .المجلد (31) ، الخرطوم . السودان.
- 5- الحسن . علي صباح علي .(2011).تأثيرا لسداد النتروجيني والكثافة النباتية في النمو والحاصل وبعض مكوناته لمحصول الذرة الصفراء (*Zea mays L*).مجلة القادسية للعلوم الزراعية. 1 : (1) 8 -1
- 6- EL-sahooki , M.M.(1985) . A short cut method for estimating plant Leaf area in maize.J. Agron and Crop Sci , 145 : 157 – 160
- 7- Hart , F . L . and H . J . Fisher.1971 .Modren food analysis Springer verlage. New York.
- 8-Ali. H., C..L. Williams; and M.W. Jouson.1978. The relationship of leaf area to grain yield and other factors in corn (*Zea mays L.*). Eurplanzeney ditg. 80.p:320-325.
- 9-Oktem,A.G.andA.Oktem 2005 .Effect of nitrogen and intra rows space on sweet corn (*Zea mays saccharata-strut*)ear characteristics Asian.J.plant Sci.,4(4):361-364.
- 10-هاشم ، محمد علوان . (2006) . تأثير الاثيفون والنتروجين في نمو وحاصل اصناف مختلفة من الحنطة الناعمة (*Triticum aestivum L.*) .رسالة ماجستير . كلية الزراعة / جامعة بغداد .
- 11-الألوسي ، عباس عجيل ومحدث مجيد الساهوكي . 2007 . استجابة سلالات وهجن من الذرة الصفراء تحت قلة وكفاية الماء ، مجلة تكريت للعلوم الزراعية ، 7 (1) : 113-12 .
- 12- Arif , M ., M . T . Jan, N . V . Khan ; H . Akbar , S . A . Kkhan ; M . J . Khan A. Khan ; I . Munir ; M . Saeed and A . Iqbal . (2010) . Impact of plant population and nitrogen levels on maize . Pakistan Journal Botny , 42 (6) : 3907 – 3913 .
- 13-العبيدي ، محمد سعيد . (2000) . استخدام الكلثار والاثيفون لتحسين النمو والحاصل والتحمل الجفاف لصفين من الحنطة (*Triticum aestivum L.*). أطروحة دكتوراه . كلية الزراعة / جامعة الموصل .

- 14-الدليمي ، عزيز حامد مجيد . 2004 . التضريب التبادلي بين تراكيب وراثية مختلفة من الذرة الصفراء (Zeamays L.) ، رسالة ماجستير ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد . 12-الساهوكي ، مدحت مجيد . (1990)
الذرة الصفراء انتاجها وتحسينها . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . جامعة بغداد .
- 15- Akman , Z . (2002) . Effect of tillage removing and plant density on ear yield of sweet corn (*Zea mays* Sacharata sturt) . Pak . J . Bio . sci . 5 (9) : 90 .
- 16-El-Talib, M.A.; E.A Elamin, M.M. ElGaziri and Y.F Elmahi.2005. Combined effect on nitrogen fertilization and soil of CaCo3 contents on corn performance in Al-mari soil library plant. Nutr. 28(9) 1619-1632.
- 17-Chen-Liang; Z. Baoshi, W. Hang Shan, L. Qin De, F. Jun, Y. Haillang; C. Cheng and S. Zhuo (2007). Effects of planting density and ecological environment on grain yield and quality in maize. J. of Maize Sci., 15 (2): 88–93.
- 18-شويليه ، ليث خضر حسان.2000. تأثير الكثافة النباتية وطريقة توزيعها ومستويات النتروجين في حاصل الذرة الصفراء (Zea mays L.) ، رسالة ماجستير ، كلية الزراعة ، جامعة بغداد.
- 19- El- Gizawy , N . K .B . (2009) . Effect of nitrogen rate and plant density on agronomic nitrogen efficiency and maize yield following wheat and faba bean . Am . Euras . Journal Agriculture and Environment Science ., 5 (3): 378 – 386.