

دراسة مختبرية في تأثير دقائق النانو فضة والسماط العضوي وحامض السالسليك في صفات النمو الخضري والانزيمات المؤكسدة لزهرة الشمس (*Helianthus annuus* L.) الصنف الاسباني Viki

تاريخ الاستلام 2015/1/18

تاريخ القبول 2015/3/15

عبد الامير علي ياسين

وسن حمزة مزعل

Wh\_mg2000 @ Yahoo.com

\* قسم علوم الحياة / كلية التربية / جامعة القادسية

الخلاصة :

نفذت التجربة بتاريخ 2013/10/28 ولغاية 2013/ 12/4 وفي هذه التجربة نفعت بذور زهرة الشمس بتركيزين من النانو فضة 25, 50 مل /لتر وحامض السالسليك بتركيزين 60,30 ملغم/لتر ثم رشت النباتات الناتجة في مرحلة الاوراق الحقيقية الثالثة بالسماط العضوي بتركيزين 0.75 غم /لتر<sup>-1</sup> و 1.5 غم /لتر<sup>-1</sup> اضافة الى معاملة المقارنة بهدف معرفة تاثيراتها في مؤشرات النمو ومحتوى المجموع الخضري من الـ DNA و RNA ومحتوى الاوراق من catalyase والـ peroxidase .

استعمل التصميم CRD للتجربة بتوليفات من بعض معاملات دقائق النانو فضة والسماط العضوي ( الكستار ) وحامض السالسليك وبـ 15 معاملة وبسبع مكررات. اظهرت النتائج المستحصلة ماياتي: ان نفع البذور بـ 50 مل/لتر من دقائق النانو فضة اعطى اعلى التأثيرات الايجابية في جميع مؤشرات النمو الخضري ومحتوى المجموع الخضري من الـ DNA و RNA و catalyase والـ peroxidase. اما تأثير رش المجموع الخضري بالسماط العضوي فقد اظهر التركيز 1.5 غم/لتر زيادة معنوية في جميع مؤشرات النمو قيد الدراسة. حققت التوليفة المكونة من 50 مل/لتر من دقائق النانو فضة و 1.5 غم/لتر من السماط العضوي تأثيرا ايجابيا في ارتفاع النبات، طول الجذر، الوزن الطري والجاف للمجموع الخضري والجذري، محتوى الاوراق من الكلوروفيل الكلي وعنصر K والـ DNA و RNA و catalyase فيما لم يكن لها أي تأثير معنوي على الوزن الجاف للمجموع الخضري والجذري ومحتوى الاوراق من peroxidase .

Biology ClassificationQK 710-899

الكلمات المفتاحية : حامض السالسليك ، catalyase ، peroxidase ، دقائق النانو فضة

\*البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث الثاني

## المقدمة

المتبعة من خلال استعمال الاسمدة العضوية التي تساهم في توفير العناصر الرئيسية NPK والعناصر الصغرى لسد حاجة النبات اثناء موسم النمو (16) و(17). فالنتروجين والفسفور يلعبان دوراً مهماً في نبات زهرة الشمس وذلك عن طريق مساهمتهما في بناء الاغشية الخلوية والكلوروفيلات ومركبات الطاقة وتكوين الاحماض النووية مقارنة باستعمال الاسمدة الكيميائية ذات التأثير السلبي على صحة الانسان والتربة .

يعد السماد العضوي (Algastar) من الاسمدة العضوية الطبيعية المستخرجة من المستخلصات البحرية وهو غني بالاحماض الامينية والهرمونات الطبيعية وحسب النشرة الارشادية للسماد فإنه يتألف من النتروجين بنسبة 1% والبوتاسيوم بنسبة 18% وحامض اللاكتيك بنسبة أكثر من 10% والكبريت بنسبة 1.3% ومنظمات نمو طبيعية ومواد عضوية بنسبة 45%. وبذلك فهو يساهم في رفع نسبة الانبات ويعمل على انتاج شتلات قوية ، وزيادة الانتاجية وجودة الثمار.

كما ان استعمال حامض السلسليك Salicylic acid هو الاخر له دور مهم في تعزيز النمو الايجابي للنبات ، اذ يعمل اضافة لكونه من منظمات النمو التي تكون ذات طبيعية فينولية فإنه يشارك في تنظيم العديد من العمليات الفسيولوجية في النبات مثل اغلاق الثغور والتمثيل الضوئي وامتصاص الايونات والتثبيت الحيوي للثايلين وتحمل الاجهاد والتخلص من الجذور الحرة وتأثيراتها السلبية (18) و(19).

## المواد وطرائق العمل

كانت التجربة على نبات زهرة الشمس (*Helianthus annuus L.*) الصنف الاسباني Viki تهدف ايجاد تأثير دقائق الفضة النانوية والسماد العضوي (الكستار) وحامض السلسليك كل على افراد وتداخلات بعضاً من توليفاتها في النمو ومحتوى المجموع الخضري من الانزيمات المؤكسدة . تم الحصول على البذور للصنف المذكور من المكاتب الزراعية الكائنة في منطقة السنك/ بغداد / وهي من انتاج شركة Fito semillas العالمية . وبعد الصنف Viki قادراً على التكيف مع الظروف المناخية والزراعية ويحتوي على نسبة عالية من حامض الاوليك الذي يعد من الاحماض الدهنية غير المشبعة . زرعت البذور في اصص فلينية مقسمة الى خلايا بابعاد (6 × 3 سم) وبعمق 5 سم ووضعت الاصص الحاوية على البذور في حاضنة النمو النباتية لتحديد تأثير دقائق الفضة النانوية والسماد العضوي (الكستار) وحامض السلسليك في محتوى المجموع الخضري للنباتات في مرحلة الورقة الحقيقية الثالثة من الـ DNA , RNA والانزيمات المؤكسدة catalase , peroxidase التي يمكن ان تعكس نشاط النبات بالتجربة . استعمل التصميم CRD للتجربة بتوليفات من بعض معاملات دقائق النانو فضة والسماد العضوي (الكستار) وحامض السلسليك وبـ 15 معاملة وبسبع مكررات . تم زراعة البذور في اصص فلينية مقسمة الى خلايا بعد ملئها ببتموس نوع (Van

يعد نبات زهرة الشمس Sunflower ) *Helianthus annuus L.* من المحاصيل الحولية الزيتية التي تزرع في عروتين ربيعية وخريفية . ويعود النبات الى العائلة المركبة Compositae (Asteraceae) (1) . يعد الموطن الاصلي لنبات زهرة الشمس الولايات المتحدة الامريكية وبالتحديد جنوب غرب الولايات المتحدة (2) و(3) . وقد استعمل النبات باعتباره غذاءً من قبل الهنود الحمر الساكنين هناك ومنها انتشر الى بقية الولايات . كما انتشرت من امريكا الى السهول الوسطى لكندا من شمالها الى جنوبها . وفي سنة 1954 وجد أن هناك 67 نوعاً من هذا النبات منتشرة في جميع انحاء كندا (4) .

اما في العراق فقد عرف هذا النبات عند منتصف القرن العشرين وعلى نطاق واسع في محافظة السليمانية وزرع في المناطق الشمالية والوسطى من العراق (5) . يستعمل زيت زهرة الشمس في صناعة الصابون والاصباغ ويستخرج من سيفانه مواد كيميائية أولية تدخل في تحضير الاسمدة الكيميائية وفي عمل الزجاج (6) و(7) . تُعد بذور زهرة الشمس مصدراً غذائياً هاماً للانسان لغناها بالزيوت فضلاً عن احتواء الزيوت على نسبة عالية من الاحماض الدهنية غير المشبعة التي تستخدم للطبخ ولوقود الديزل والفيتامينات القابلة للذوبان بالدهون (8) . ولأهمية هذا النبات على مستوى العالم بصورة عامة وعلى مستوى العراق بصورة خاصة ولانخفاض أنتاجيته في العراق فلا بد من استعمال أفضل الطرائق او التقنيات الحديثة التي تؤدي الى زيادة الحاصل وتشجع في زيادة المساحة المزروعة بهدف رفع الانتاجية والمورد الاقتصادي . ومن ضمن هذه التقانات هي التقنية التي يوفرها علم "تقانات الصغائر" او النانوتكنولوجي والذي يستعمل فيه مواد نانوية باحجام تتراوح بين (1-100 نانومتر) (9) . التي اظهرت تأثيرات ايجابية في مجال واسع من العلوم كالطب والهندسة والزراعة والغذاء (10) و(11) . ويعد استعمال دقائق النانو فضة Nano-silver من اكثر الجزيئات انتشاراً واستعمالاً على المستوى التجاري في تأثيراتها الايجابية في النباتات (12) و(13) . وهي تقنية حديثة جداً اذ ماقورنت باستعمال التقانات

الاخرى . فقد أوضح (14) بأن دقائق النانو فضة من الدقائق المهمة في التأثير في حاصل البذور وزيادته في نبات العصفور (*Crocus sativus L.*) . وأشار (15) في دراسته على نبات الزعتر كوتشي (*Thymus kotschyanus L.*) أن استعمال دقائق النانو فضة بخمس تراكيز (20, 40, 60, 80, 100 ملغم/ لتر ) اضافة الى معاملة المقارنة اظهر تأثيرات ايجابية في التغيير من مراحل نمو النبات وكمية المركبات الثانوية وعمل على زيادة محتوى النبات من الزيوت الاساسية ومحتوى بذورها من  $\alpha$ -terpinyl acetate بنسبة 14.2% وخاصة عند استعمال 60 ملغم / لتر من دقائق النانو فضة.

كما ان من الوسائل المهمة لزيادة النمو والانتاجية بالمستوى الامثل للنباتات هو تحسين العمليات الزراعية

4- محتوى الاوراق من الكلوروفيل الكلي (مايكروغرام /غرام وزن طري) Total chlorophyll

### ثانيا: الصفات الكيميائية وشملت :

#### Chemical characterstics

1- محتوى المجموع الخضري من DNA, RNA عند الورقة الحقيقية الثالثة (مايكروغرام/ غرام مادة جافة) content

Shoot of DNA and RNA حسب طريقة (21)

2- تقدير محتوى الاوراق من الانزيمات المؤكسدة عند الورقة الحقيقية الثالثة (وحدة / غم وزن طري)

Leaves content of oxidative enzymes

حسب طريقة

(22)

### التحليل الاحصائي :

#### Statistical analysis

وضعت المعاملات في التصميم العشوائي

الكامل (CRD) Completely randomized

design وتضمنت توليفة من بعض معاملات دقائق النانو

فضة والسماذ العضوي (الكستار) وحامض السالسليك

وتداخلاتها وبـ 15 معاملة و7 مكررات لكل معاملة .

وقورنت متوسطات المعاملات باستعمال إختبار أقل فرق

معنوي (LSD) Least Significant Difference

عند مستوى معنوية 0.05 (23).

### النتائج والمناقشة

#### النتائج:

#### اولا: الصفات الخضرية

##### 1- ارتفاع النبات (سم)

egmond الهولندي الصنع الذي يمتاز بمواصفات عالية الجودة وحسب نشرته الارشادية فهو يحتوي على نسبة عالية من العناصر الضرورية اضافة الى ان قيمة الـ pH له تتراوح بين (5 - 6.5) والتوصيلية الكهربائية E.C بين (0.8 - 1.5) ويكفي لاستمرار نمو النبات بصورة جيدة لمدة تتراوح بين (4 - 6) اسابيع .

زرعت 10 بذور في كل خلية بعد نقعها بتركيزين من محلول دقائق النانو فضة هما 25 او 50 مل/ لتر كلا على انفراد اضافة الى معاملة الماء المقطر وتركيزين من محلول حامض السالسليك 30 او 60 ملغم/ لتر كلا على انفراد فضلا عن معاملة الماء المقطر . ثم وضعت الاصص الفلينية في حاضنة النمو النباتية في درجة الحرارة (25±2) ورطوبة نسبية 70% واضاءة 12 ساعة لكل 24 ساعة حسب طريقة (20) . وعند بزوغ البادرات جرى خفها بتاريخ 2013 /11/6 وتم الابقاء على 3 بادرات في كل خلية وعند وصول النباتات الى عمر ثلاث ورقات حقيقية تم الرش الورقي للسماذ العضوي (الكستار) بتركيزين هما 0.75 و 1.5 غم / لتر اضافة الى الرش بالماء المقطر وبعد مرور عشرة ايام على الرش الورقي بالسماذ العضوي (الكستار) اي في تاريخ 2013/12/4 تم حساب مايلي :

#### اولا: الصفات الخضرية Vegetative characterstics وشملت

1- ارتفاع النبات في مرحلة الورقة الثالثة الحقيقية (سم)

Plant height at the third true leaf

2- طول الجذر للنبات عند الورقة الحقيقية الثالثة (سم)

Root length

3- الوزنين الطري والجاف للمجموعين الخضري

والجذري (غم. نبات<sup>1</sup>) للنبات عند الورقة الحقيقية الثالثة

dry

Fresh and weights of shoot and root

النتائج في جدول (1) اظهرت تأثير النقع بدقائق النانو فضة في ارتفاع النبات أذ سجل التركيز 50 مل/لتر أعلى ارتفاع  
**جدول (1): تأثير بعض التراكيز من دقائق الفضة النانوية والسماذ العضوي (الكستار) و حامض السالسليليك**  
**وتداخلاتها في ارتفاع النبات (سم)**

| متوسط النقع<br>بدقائق النانو<br>فضة<br>وحامض<br>السالسيليك |  | الرش بالسماذ العضوي ((الكستار)) ( غم /لتر) |       |       | معاملات دقائق<br>النانو فضة<br>وحامض<br>السالسيليك |                                                  |
|------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            |  | 1.5                                        | 0.75  | 0     |                                                    |                                                  |
| 14.90                                                      |  | 18.57                                      | 16.71 | 9.43  | 0                                                  | تغير الجذور<br>بدقائق النانو<br>فضة (مل/لتر)     |
| 18.29                                                      |  | 20.43                                      | 18.14 | 16.29 | 25                                                 |                                                  |
| 20.76                                                      |  | 23.00                                      | 21.29 | 18.00 | 50                                                 |                                                  |
| 17.79                                                      |  | 19.64                                      | 18.29 | 15.43 | 30                                                 | تغير الجذور<br>بحامض<br>السالسيليك<br>(ملغم/لتر) |
| 18.31                                                      |  | 19.86                                      | 17.50 | 17.57 | 60                                                 |                                                  |
|                                                            |  | 20.30                                      | 18.39 | 15.34 | متوسط السماذ العضوي (الكستار)<br>غم / لتر          |                                                  |
| 1.02                                                       |  | 0.79                                       |       |       | LSD 0.05<br>للرش بالسماذ<br>العضوي (الكستار)       |                                                  |
|                                                            |  | 1.78                                       |       |       | للتداخلات                                          |                                                  |

21.29 سم مقارنة مع بعض التوليفات الأخرى من تداخل بعض المعاملات من دقائق النانو فضة وتراكيز السماذ العضوي (الكستار) و حامض السالسليليك وتداخلاتها مع معاملة المقارنة والتي حققت أقل ارتفاع بلغت 9.43 سم.

## 2- طول الجذر (سم)

أظهر التحليل الإحصائي في جدول (2) أن أطوال جذور النباتات المعاملة بـ 50 مل/لتر من دقائق النانو فضة

للنبات بلغ 20.76 سم والذي اختلف اختلافا معنويا عن جميع التراكيز للمعاملات الأخرى. أظهر السماذ العضوي (الكستار) بالتركيز 1.5 غم/لتر أعلى ارتفاع للنباتات المعاملة به بلغت 20.30 سم الذي اختلف اختلافا معنويا مقارنة مع التركيز 0.75 غم/لتر البالغ 18.39 سم أو معاملة المقارنة البالغ النباتات فيها 15.34 سم.

وأظهر التداخل الثنائي المعنوي أن التوليفة المكونة من 50 مل/لتر من دقائق النانو فضة و 1.5 غم/لتر من السماذ العضوي أعطت أعلى ارتفاع للنباتات الناتجة بلغ 23.00 سم وكانت الأعلى ضمن جميع التوليفات الأخرى بلغت

**جدول (2): تأثير بعض التراكيز من دقائق الفضة النانوية والسماط العضوي (الكستار) و حامض الساليسيك وتداخلاتها في طول الجذر (سم)**

| متوسط النفع بدقائق النانو فضة و حامض الساليسيك | الرش بالسماط العضوي (الكستار) ( غم /لتر) |      |      | معاملات دقائق النانو فضة و حامض الساليسيك |                                                  |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                | 1.5                                      | 0.75 | 0    |                                           |                                                  |
| 4.71                                           | 6.71                                     | 5.29 | 2.14 | 0                                         | تأثير جذور بدقائق النانو فضة (مل/لتر)            |
| 7.12                                           | 7.86                                     | 7.36 | 6.14 | 2                                         |                                                  |
| 7.93                                           | 8.79                                     | 8.29 | 6.71 | 5                                         |                                                  |
| 6.05                                           | 7.14                                     | 6.14 | 4.86 | 5                                         | تأثير حامض الساليسيك (ملغم/لتر)                  |
| 7.19                                           | 8.71                                     | 7.43 | 5.43 | 0                                         |                                                  |
|                                                |                                          |      |      | 3                                         |                                                  |
|                                                | 7.84                                     | 6.90 | 5.06 | 6                                         | متوسط السماط العضوي (الكستار) غم / لتر           |
| 0.69                                           | 0.53                                     |      |      | 0                                         | LSD 0.05 للرش بالسماط العضوي (الكستار) للتداخلات |
|                                                | N.S                                      |      |      |                                           |                                                  |

الخضري ، أذ يتبين ان التركيز 50 مل/لتر من دقائق النانو فضة اعطى اعلى وزن طري بلغ 1.906 غم. نبات<sup>1</sup> مقارنة بالتركيز الاقل 25 مل/لتر منه والذي اعطى وزناً طرياً 1.803 غم. نبات<sup>1</sup>.  
معاملة التركيز 60 ملغم/لتر من حامض الساليسيك اعطت نباتات بوزن طري 1.834 غم. نبات<sup>1</sup> وهي اعلى معنوياً من معاملة استعمال التركيز 25 مل /لتر من دقائق النانو فضة 1.803 غم. نبات<sup>1</sup> والمعاملات الاخرى و30 ملغم/لتر من حامض الساليسيك البالغة 1.763 غم. نبات<sup>1</sup> او معاملة المقارنة البالغة 1.360 غم. نبات<sup>1</sup> . استعمال السماط العضوي (الكستار) أظهر زيادة معنوية وبصورة متدرجة مع زيادة التراكيز من 0.0 ، 0.75 و 1.5 غم/لتر والتي اعطت 1.453 ، 1.840 ، 1.907 غم. نبات<sup>1</sup> على التوالي.

التداخل الثنائي يوضح تأثير كل من التراكيز العالية لدقائق النانو فضة 50 مل/لتر مع السماط العضوي (الكستار) 1.5 غم/لتر والتي عملت على تحقيق اعلى وزن طري بلغ 2.037 غم. نبات<sup>1</sup> على الرغم من عدم اختلافها معنوياً عن التوليفة المكونة من التراكيز العالية لحامض الساليسيك 60 ملغم/لتر مع 1.5 غم/لتر من السماط العضوي والتي اعطت 1.950 غم. نبات<sup>1</sup> والتوليفة المكونة من 50 مل/لتر دقائق النانو فضة و0.75 غم/لتر من السماط العضوي (الكستار) والتي اعطت 1.907 غم. نبات<sup>1</sup> ولكنها اختلفت عن باقي التوليفات الاخرى وعن معاملة المقارنة التي اعطت 0.511 غم. نبات<sup>1</sup>.

الاعلى اذ سجلت 7.93 سم مقارنة بجميع المعاملات الاخرى . كما تشير النتائج المعروضة في الجدول نفسه ان اطوال جذور النباتات المعاملة بحامض الساليسيك بالتركيز 60 ملغم/لتر لم تختلف معنوياً عن اطوال جذور النباتات المعاملة بالتركيز 25 مل/لتر من دقائق النانو فضة حيث بلغ 7.19 و 7.12 سم لكل منهما على ، التوالي الا انها اعلى من معاملة المقارنة 4.71 او معاملة 30 ملغم/لتر من حامض الساليسيك .

كما تشير معاملات السماط العضوي بنفوق التركيز 1.5 غم/لتر منه والبالغة 7.84 سم على التركيز 0.75 غم/لتر والبالغ 6.90 سم وكانت الاعلى مقارنة بمعاملة المقارنة التي بلغت 5.06 سم. رغم ان التداخل بين بعض المعاملات من دقائق النانو فضة وتراكيز السماط العضوي (الكستار) وحامض الساليسيك وتداخلاتها لم يكن معنوياً الا ان هناك ميل لان تكون اطوال الجذور المعاملة بالتركيز 50 مل/لتر من دقائق النانو فضة مع التراكيز 0.75 و 1.5 غم /لتر من السماط العضوي وحامض الساليسيك بالتركيز 60 ملغم /لتر هي الاعلى من بين جميع التوليفات الاخرى حيث بلغت 8.29 سم ، 8.79 سم و 8.71 سم ، على التوالي .

**3: الوزن الطري للمجموع الخضري (غم. نبات<sup>1</sup>)**

الجدول (3) يوضح التأثير المعنوي لبعض معاملات دقائق النانو فضة وتراكيز السماط العضوي مع حامض الساليسيك وتداخلاتها على الوزن الطري للمجموع

جدول (3): تأثير بعض التراكيز من دقائق الفضة النانوية والسماط العضوي (الكستار) و حامض السالسليليك وتداخلاتها في الوزن الطري للمجموع الجذري (غم. نبات-1)

| معاملات دقائق<br>النانو فضة<br>وحامض<br>السالسيليك |    | الرش بالسماذ العضوي ((الكستار)) ( غم /لتر) |       |       |                                                            |
|----------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|
|                                                    |    | 0                                          | 0.75  | 1.5   | متوسط النقع<br>بدقائق النانو<br>فضة<br>وحامض<br>السالسيليك |
| نقع الجذور<br>بدقائق النانو فضة<br>(مل/لتر)        | 0  | 0.511                                      | 1.781 | 1.789 | 1.360                                                      |
|                                                    | 25 | 1.699                                      | 1.831 | 1.879 | 1.803                                                      |
|                                                    | 50 | 1.773                                      | 1.907 | 2.037 | 1.906                                                      |
| نقع الجذور<br>بحامض<br>السالسيليك<br>(ملغم/لتر)    | 30 | 1.620                                      | 1.787 | 1.883 | 1.763                                                      |
|                                                    | 60 | 1.661                                      | 1.891 | 1.950 | 1.834                                                      |
| متوسط السماذ العضوي<br>(الكستار)<br><br>غم / لتر   |    | 1.453                                      | 1.840 | 1.907 |                                                            |
| LSD 0.05<br><br>للرش بالسماذ العضوي<br>(الكستار)   |    | 0.070                                      |       |       |                                                            |
| للتداحلات                                          |    | 0.157                                      |       |       |                                                            |

بلغ 1.698 غم. نبات<sup>1</sup> الذي اختلف اختلافا معنوياً عن جميع المعاملات الاخرى بضمنها معاملة المقارنة 1.039 غم. نبات<sup>1</sup>.

#### 4: الوزن الطري للمجموع الجذري (غم. نبات<sup>1</sup>)

يتضح من الجدول (4) ان التركيز 50 مل/لتر من دقائق النانو فضة حقق أعلى وزن طري للمجموع الجذري

**جدول (4): تأثير بعض التراكيز من دقائق الفضة النانوية والسماط العضوي (الكستار) و حامض السالسليلك وتداخلاتها في الوزن الطري للمجموع الجذري (غم. نبات-1)**

| متوسط النفع<br>بدقائق النانو<br>فضة<br>وحامض<br>السالسيليك | الرش بالسماذ العضوي ((الكستار)) ( غم /لتر) |       |       | معاملات دقائق<br>النانو فضة<br>وحامض<br>السالسيليك |                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                            | 1.5                                        | 0.75  | 0     |                                                    |                                                |
| 1.039                                                      | 1.493                                      | 1.384 | 0.240 | 0                                                  | نفع النور<br>بدقائق النانو<br>فضة (مل/لتر)     |
| 1.559                                                      | 1.720                                      | 1.649 | 1.307 | 25                                                 |                                                |
| 1.698                                                      | 1.859                                      | 1.793 | 1.441 | 50                                                 |                                                |
| 1.490                                                      | 1.630                                      | 1.581 | 1.257 | 30                                                 | نفع النور<br>بحامض<br>السالسيليك<br>(ملغم/لتر) |
| 1.564                                                      | 1.717                                      | 1.671 | 1.303 | 60                                                 |                                                |
|                                                            | 1.684                                      | 1.616 | 1.110 | متوسط السماذ العضوي<br>((الكستار))<br>غم / لتر     |                                                |
| 0.070                                                      | 0.054                                      |       |       | LSD 0.0 5<br>للرش بالسماذ<br>العضوي ((الكستار))    |                                                |
|                                                            | 0.121                                      |       |       | للتدائلات                                          |                                                |

جدول (5) يوضح ان دقائق النانو فضة حققت تأثيراً ايجابياً في الوزن الجاف للمجموع الخضري للنبات اذ حقق التركيز 50 مل/ لتر اعلى وزن جاف للمجموع الخضري بلغ 0.3095 غم. نبات<sup>1</sup> والذي اختلف معنوياً عن معاملة التركيز 25 مل/لتر التي اعطت ثاني وزناً جافاً للمجموع الخضري بلغ 0.2605 غم. نبات<sup>1</sup> والذي لم يختلف معنوياً عن معاملة حامض السالسليلك بالتركيز 60 ملغم /لتر البالغة 0.2595 غم. نبات<sup>1</sup> وهذا يوضح اهمية النانو فضة في زيادة الوزن الجاف للمجموع الجذري .

السماط العضوي ( الكستار) هو الاخر اثر معنوياً اذ حقق التركيز 1.5 غم/لتر منه اعلى وزن جاف بلغ 0.2897 غم. نبات<sup>1</sup> مقارنة مع التركيز 0.75 منه البالغة 0.2611 غم. نبات<sup>1</sup> او مقارنة مع معاملة المقارنة 0.2006 غم. نبات<sup>1</sup>. لم تظهر التداخلات الثنائية بين بعض معاملات دقائق النانو فضة وتراكيز السماط العضوي مع حامض السالسليلك وتداخلاتها اي تأثيراً معنوياً في الوزن الجاف للمجموع الجذري الا ان هناك ميول لمعاملات النانو فضة بالتركيز 50 مل/لتر مع التركيز 0.75 و 1.5 غم/لتر من السماط العضوي ان تمتلك اعلى الاوزان الجافة .

حامض السالسليلك بالتركيز العالي 60 ملغم/لتر حقق اعلى وزن طري للمجموع الجذري بلغ 1.564 غم. نبات<sup>1</sup> والذي لم يختلف معنوياً عن التركيز 25 مل/لتر من دقائق النانو فضة ولكنه اختلف عن باقي المعاملات المتبقية بضمنها معاملة المقارنة التي انتجت 1.039 غم. نبات<sup>1</sup> . وظهرت معاملات السماط العضوي (الكستار) ان التركيز 1.5 غم/لتر حقق اعلى وزناً طرياً لجذور النبات بلغ 1.684 غم. نبات<sup>1</sup> والذي اختلف اختلافاً معنوياً عن التركيز 0.75 غم/لتر وانتاجه 1.616 غم. نبات<sup>1</sup> وعن معاملة المقارنة 1.110 غم. نبات<sup>1</sup>.

واوضح التداخل الثنائي المعنوي بين دقائق النانو فضة والسماط العضوي ان التوليفة المكونة من 50 مل/لتر دقائق النانو فضة و 1.5 غم/لتر من السماط العضوي حققت اعلى وزن طري بلغ 1.859 غم. نبات<sup>1</sup> التي لم تختلف معنوياً مقارنة بالتوليفة المكونة من 50 مل/لتر من دقائق النانو فضة و 0.75 غم/لتر من السماط العضوي والتي اعطت 1.793 غم. نبات<sup>1</sup> ولكنها اختلفت مقارنة ببقية التوليفات الاخرى ومعاملة المقارنة التي اعطت وزناً طرياً للجذور بلغ 0.240 غم. نبات<sup>1</sup>.

**5: الوزن الجاف للمجموع الخضري (غم. نبات-1)**

(1)

**جدول (5): تأثير بعض التراكيز من دقائق الفضة النانوية والسماط العضوي (الكستار) و حامض السالسليليك وتداخلاتها في الوزن الجاف للمجموع الخضري (غم. نبات<sup>1</sup>)**

| متوسط النقع<br>بدقائق النانو<br>فضة<br>وحامض<br>السالسيليك | الرش بالسماذ العضوي <sup>(الكستار)</sup> ( غم /لتر) |        |        | معاملات دقائق<br>النانو فضة<br>وحامض<br>السالسيليك |                                                  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                            | 1.5                                                 | 0.75   | 0      |                                                    |                                                  |
| 0.1995                                                     | 0.2329                                              | 0.2143 | 0.1514 | 0                                                  | تفع البذور<br>بدقائق النانو<br>(غم /لتر) فضة     |
| 0.2605                                                     | 0.2971                                              | 0.2586 | 0.2257 | 25                                                 |                                                  |
| 0.3095                                                     | 0.3571                                              | 0.3243 | 0.2471 | 50                                                 |                                                  |
| 0.2233                                                     | 0.2643                                              | 0.2257 | 0.1800 | 30                                                 | تفع البذور<br>بحامض<br>السالسيليك<br>(ملغم /لتر) |
| 0.2595                                                     | 0.2971                                              | 0.2829 | 0.1986 | 60                                                 |                                                  |
|                                                            | 0.2897                                              | 0.2611 | 0.2006 | متوسط السماذ العضوي<br>(الكستار)<br>غم / لتر       |                                                  |
| 0.0136                                                     | 0.0105                                              |        |        | LSD 0.05<br>للرش بالسماذ<br>العضوي (الكستار)       |                                                  |
| N.S                                                        |                                                     |        |        | للتداخلات                                          |                                                  |

المقارنة البالغة 0.1581 غم. نبات<sup>1</sup>. أما عن تأثير الرش بالسماط العضوي (الكستار) فقد حقق التركيز 1.5 غم/ لتر أعلى وزناً جافاً بلغ 0.2066 غم. نبات<sup>1</sup> الذي اختلف معنوياً عن معاملة التركيز 0.75 غم/لتر والتي اعطت 0.1846 غم. نبات<sup>1</sup> أو مقارنة بمعاملة المقارنة التي اعطت 0.1589 غم. نبات<sup>1</sup>. أما عن تأثير التداخل الثنائي بين المعاملات فلم يكن له اي تأثير معنوي على الوزن الجاف للمجموع الجذري للنبات .

#### 6: الوزن الجاف للمجموع الجذري (غم. نبات<sup>1</sup>)

الجدول (6) يظهر ان الوزن الجاف للمجموع الخضري كان في اعلاه عند المعاملتين 50 مل/لتر من النانو فضة و 60 ملغم/لتر من حامض السالسليليك والذان اعطيا 0.1976 و 1.986 غم. نبات<sup>1</sup> ، على التوالي ولم يختلفا معنوياً عن بعضهما . كما يوضح الجدول ان معاملة 25 مل/لتر من دقائق النانو فضة اعطت وزناً جافاً بلغ 1.895 غم. نبات<sup>1</sup> أعلى من معاملة حامض السالسليليك بالتركيز 30 ملغم/لتر 1.729 غم. نبات<sup>1</sup> او نباتات معاملة



**جدول (6): تأثير بعض التراكيز من دقائق الفضة النانوية والسماذ العضوي (الكستار و حامض السالسليك وتداخلاتها في الوزن الجاف للمجموع الجذري (م. نبات-1)**

| متوسط النقع بدقائق النانو فضة و حامض السالسليك | الرش بالسماذ العضوي (الكستار) ( غم /لتر) |        |        | معاملات دقائق النانو فضة و حامض السالسليك        |   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------------|---|
|                                                | 1.5                                      | 0.75   | 0      | 0                                                | 2 |
| 0.1581                                         | 0.1886                                   | 0.1614 | 0.1243 | 5                                                | 5 |
| 0.1895                                         | 0.2086                                   | 0.1943 | 0.1657 | 5                                                | 0 |
| 0.1976                                         | 0.2229                                   | 0.1857 | 0.1843 | 3                                                | 0 |
| 0.1729                                         | 0.1971                                   | 0.1771 | 0.1443 | 6                                                | 0 |
| 0.1986                                         | 0.2157                                   | 0.2043 | 0.1757 | 0                                                | 0 |
|                                                | 0.2066                                   | 0.1846 | 0.1589 | متوسط السماذ العضوي (الكستار) غم / لتر           |   |
| 0.0120                                         | 0.0093                                   |        |        | LSD 0.05 للرش بالسماذ العضوي (الكستار) للتداخلات |   |
|                                                | N.S                                      |        |        |                                                  |   |

الكلوروفيل الكلي بلغ 11.65 (مايكروغرام/ غرام وزن طري) الذي اختلف معنويا عن جميع المعاملات الاخرى لم

**7: محتوى الاوراق من الكلوروفيل الكلي ( مايكرو غرام / غرام وزن طري )**

يلاحظ من الجدول (7) التأثير المعنوي للتركيز العالي لدقائق النانو فضة 50 مل/لتر الذي تميز باعلى محتوى من

**جدول (7): تأثير بعض التراكيز من دقائق الفضة النانوية والسماذ العضوي (الكستار و حامض السالسليك وتداخلاتها في محتوى الاوراق من الكلوروفيل الكلي (ملغم/غم وزن طري**

| متوسط النقع بدقائق النانو فضة و حامض السالسليك | الرش بالسماذ العضوي (الكستار) ( غم /لتر) |       |       | معاملات دقائق النانو فضة و حامض السالسليك        |   |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|---|
|                                                | 1.5                                      | 0.75  | 0     | 0                                                | 2 |
| 7.26                                           | 9.36                                     | 9.21  | 3.21  | 5                                                | 5 |
| 10.03                                          | 10.76                                    | 9.99  | 9.34  | 5                                                | 0 |
| 11.65                                          | 12.56                                    | 11.76 | 10.63 | 3                                                | 0 |
| 9.46                                           | 10.03                                    | 9.50  | 8.86  | 6                                                | 0 |
| 10.46                                          | 11.17                                    | 10.80 | 9.40  | 0                                                | 0 |
|                                                | 10.77                                    | 10.25 | 8.29  | متوسط السماذ العضوي (الكستار) غم / لتر           |   |
| 0.66                                           | 0.51                                     |       |       | LSD 0.05 للرش بالسماذ العضوي (الكستار) للتداخلات |   |
|                                                | 1.14                                     |       |       |                                                  |   |

تبيين النتائج في جدول (8) ان تركيز النانو فضة 50 مل/لتر حقق تأثيرات معنوية في محتوى المجموع الخضري من DNA بلغ 2.526 ( مايكروغرام/غرام مادة جافة) التي اختلفت عن باقي نباتات المعاملات بضمنها معاملات حامض السالسليلك ومعاملة المقارنة 1.479 ( مايكروغرام/غرام مادة جافة). ولم تختلف معاملات النانو فضة 25 مل/لتر وتركيزي حامض السالسليلك عن بعضهما معنوياً الا انهما اعلى من نباتات معاملة المقارنة . كما ان السماد العضوي (الكستار) وبتركيزيه العالي 1.5 غم/ لتر والواطيء 0.75 غم/لتر هو الآخر اثر تأثيرا ايجابيا في محتوى الاوراق من الـ DNA اذ اعطى 2.314 و 2.243 (مايكروغرام/غرام مادة جافة) ، على التوالي مقارنة بنباتات بمعاملة المقارنة 1.676 ( مايكروغرام/غرام مادة جافة).

التدخل الثنائي لعوامل الدراسة اشار الى ان التوليفة المكونة من 50 مل/لتر من دقائق النانو فضة مع 1.5 غم/لتر من السماد العضوي (الكستار) اعطت اعلى محتوى للـ DNA في اوراقها الجافة بلغت 2.644 (مايكروغرام/غرام مادة جافة) ، وهي لم تختلف معنوياً عن باقي التوليفات من المعاملات التي اشتملت على النانو فضة بالتركيز 50 مل/لتر مع 0.75 غم/لتر من السماد العضوي 2.577 (مايكروغرام/غرام مادة جافة) او مع التوليفات الاخرى التي اشتملت على تركيزي حامض السالسليلك مع تركيزي السماد العضوي والتي اختلفت جميعها معنوياً عن معاملة المقارنة 1.231، 1.591، 1.613 (مايكروغرام/غرام مادة جافة)، على التوالي .

جدول (8): تأثير بعض التراكيز من دقائق الفضة النانوية والسماد العضوي (الكستار) و حامض السالسليلك وتداخلاتها في محتوى المجموع الخضري من DNA (مايكروغرام/ ملغم مادة جافة)

| متوسط النقع<br>بدقائق النانو<br>فضة<br>وحامض<br>السالسيلك | الرش بالسماد العضوي ((الكستار)) ( غم /لتر) |       |       | معاملات دقائق<br>النانو فضة<br>وحامض<br>السالسيلك |                                                 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                           | 1.5                                        | 0.75  | 0     |                                                   |                                                 |
| 1.479                                                     | 1.613                                      | 1.591 | 1.231 | 0                                                 | تفتح الجذور بدقائق<br>النانو فضة<br>(مل/لتر)    |
| 2.182                                                     | 2.511                                      | 2.381 | 1.654 | 2                                                 |                                                 |
| 2.526                                                     | 2.644                                      | 2.577 | 2.356 | 5                                                 |                                                 |
| 2.057                                                     | 2.334                                      | 2.286 | 1.550 | 5                                                 | تفتح الجذور<br>بحامض<br>السالسيلك<br>(ملغم/لتر) |
| 2.146                                                     | 2.467                                      | 2.381 | 1.590 | 0                                                 |                                                 |
|                                                           | 2.314                                      | 2.243 | 1.676 | 3                                                 |                                                 |
|                                                           |                                            |       |       | 6                                                 |                                                 |
|                                                           |                                            |       |       | 0                                                 |                                                 |
|                                                           |                                            |       |       |                                                   | متوسط السماد<br>العضوي (الكستار)<br>غم / لتر    |
| 0.303                                                     | 0.235                                      |       |       | LSD 0.05<br>للرش بالسماد<br>العضوي (الكستار)      |                                                 |
|                                                           | 0.525                                      |       |       | للتداخلات                                         |                                                 |

يختلف تأثير التركيزان 1.5 غم/لتر و 0.75 غم/لتر من السماد العضوي في محتوى اوراقها من الكلوروفيل اذ بلغ 10.77 (مايكروغرام/ غرام وزن طري) و 10.25 (مايكروغرام/ غرام وزن طري) على التوالي وهو الاعلى مقارنة بمعاملة المقارنة البالغة 8.29 (مايكروغرام/ غرام وزن طري).

للتداخلات الثنائية بين بعض معاملات دقائق النانو فضة وتراكيز السماد العضوي مع حامض السالسليلك وتداخلاتها يظهر ان محتوى الاوراق من الكلوروفيل الكلي للنباتات المعاملة بالتركيز 50 مل/لتر مع 1.5 غم/لتر من السماد العضوي اعطت اعلى قيمة للكلوروفيل الكلي 12.56 (مايكروغرام/ غرام وزن طري) مقارنة مع جميع التوليفات الاخرى.ومما يجدر ذكره ان كمية الكلوروفيل الكلي للمعاملة المكونة من 50 مل/لتر من دقائق النانو فضة و 0.75 غم/لتر من السماد العضوي (الكستار) انتجت 11.76 (مايكروغرام/ غرام وزن طري) لم تختلف معنوياً عن التوليفة المكونة من 60 ملغم /لتر من حامض السالسليلك مع استعمال 1.5 غم/لتر من السماد العضوي التي اعطت 11.17 (مايكروغرام/ غرام وزن طري) .

## ثانياً:الصفات الكيميائية :

### 1:محتوى المجموع الخضري من DNA ( مايكروغرام/ غرام مادة جافة )

**2: محتوى المجموع الخضري من RNA )**  
 مايكروغرام/غرام مادة الجافة)  
 أظهرت النتائج في جدول (9) ان النقع بدقائق النانو فضة وبتركيزها العالي اثرت تأثيرا معنوياً في محتوى الاوراق

جدول (9): تأثير بعض التراكيز من دقائق الفضة النانوية والسماط العضوي (الكستار) و حامض السالسليلك وتداخلاتها في محتوى المجموع الخضري من RNA (مايكروغرام/ ملغم مادة جافة)

| متوسط النقع<br>بدقائق النانو<br>فضة<br>وحامض<br>السالسيليك | الرش بالسماذ العضوي ((الكستار)) ( غم /لتر) |       |       | معاملات دقائق<br>النانو فضة<br>وحامض<br>السالسيليك |                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                            | 1.5                                        | 0.75  | 0     | 0                                                  | نقع البذور<br>بدقائق النانو<br>فضة (غم/لتر)    |
| 0.853                                                      | 1.129                                      | 1.056 | 0.374 | 25                                                 |                                                |
| 1.146                                                      | 1.236                                      | 1.159 | 1.043 | 50                                                 |                                                |
| 1.279                                                      | 1.377                                      | 1.310 | 1.150 | 30                                                 |                                                |
| 1.056                                                      | 1.130                                      | 1.086 | 0.951 | 60                                                 | نقع البذور<br>بحامض<br>السالسيليك<br>(مغم/لتر) |
| 1.157                                                      | 1.250                                      | 1.207 | 1.014 |                                                    |                                                |
|                                                            | 1.224                                      | 1.163 | 0.907 | متوسط السماذ العضوي<br>(الكستار)<br>غم / لتر       |                                                |
| 0.079                                                      | 0.061                                      |       |       | LSD 0.05<br>للرش بالسماذ<br>العضوي (الكستار)       |                                                |
|                                                            | 0.138                                      |       |       | للتداخلات                                          |                                                |

### 3: محتوى الاوراق من Peroxidase ( وحدة /غم وزن طري)

الجدول (10) اوضح تميز نباتات التركيز 50 مل/لتر من دقائق النانو فضة في تحقيق اعلى محتوى للاوراق من Peroxidase في مرحلة الورقة الحقيقية الثالثة والذي بلغ 0.672 ( وحدة /غم وزن طري) والذي اختلف معنوياً عند مقارنته بالتركيز 25 مل/ لتر من دقائق النانو فضة الذي اعطى 0.561 ( وحدة /غم وزن طري) الذي لم يختلف معنوياً عن استعمال التركيز 60 ملغم/لتر من حامض السالسليلك الذي انتج 0.560 ( وحدة /غم وزن طري) الا انهما اختلفا عن نباتات معاملة المقارنة 0.366 ( وحدة /غم وزن طري).

أما تأثير الرش بالسماط العضوي فقد سجل التركيزان 1.5 و 0.75 غم/لتر تأثيراً معنوياً في محتوى الاوراق من Peroxidase مقارنة بمعاملة المقارنة رغم عدم الاختلاف معنوياً بين التركيزين (0.606 و 0.564 ) ( وحدة /غم وزن طري)، على التوالي . اما التداخلات الثنائية فلم يكن لها اي تأثير معنوي يذكر في محتوى الاوراق من Peroxidase في مرحلة الورقة الحقيقية الثالثة.

من الـ RNA اذ بلغت 1.279 ( مايكروغرام/غرام مادة جافة) التي اختلفت معنوياً بالمقارنة مع التركيز 25 مل/لتر منه الذي اعطى 1.146 ( مايكروغرام/غرام مادة جافة) كما اختلف عند المقارنة مع تراكيز حامض السالسليلك وخصوصاً تركيز 60 ملغم/لتر اذ سجل 1.157 ( مايكروغرام/غرام مادة جافة) كما اختلف مع نباتات معاملة المقارنة 0.853 ( مايكروغرام/غرام مادة جافة) . أما عن تأثير الرش بالسماط العضوي (الكستار) فقد كان للتركيز 1.5 غم/لتر من السماط العضوي (الكستار) تأثيراً كبيراً اذ بلغ محتوى الاوراق من RNA 1.224 ( مايكروغرام/غرام مادة جافة) مقارنة باقل القيم التي سجلتها نباتات معاملة المقارنة البالغة 0.907 ( مايكروغرام/غرام مادة جافة) .

التداخل الثنائي لبعض معاملات دقائق النانو فضة وتراكيز السماط العضوي مع حامض السالسليلك وتداخلاتها اشار الى ان محتوى الاوراق من مادة الـ RNA بلغت اعلاها عند نباتات التوليفتين المكونتين من 50 مل/لتر من دقائق النانو فضة مع 0.75 غم/لتر من السماط العضوي 1.310 ( مايكروغرام/غرام مادة جافة) و 50 مل/لتر من دقائق النانو فضة مع 1.5 غم/لتر من السماط العضوي 1.377 ( مايكروغرام/غرام مادة جافة) اللذان لم يختلفا معنوياً ولكنهما اختلفا معنوياً عن بقية التوليفات الاخرى من النانو فضة 25 مل/لتر و 60، 30 ملغم/لتر من حامض السالسليلك مع السماط العضوي بتركيزيه.

جدول ( 10): تأثير بعض التراكيز من دقائق الفضة النانوية والسماط العضوي (الكستار) و حامض السالسليك وتداخلاتها في محتوى الاوراق من Peroxidase (وحدة / غم وزن طري)

| متوسط النقع<br>بدقائق النانو<br>فضة<br>وحامض<br>السالسيليك | الرش بالسماذ العضوي ("الكستار") ( غم /لتر) |       |       | معاملات دقائق<br>النانو فضة<br>وحامض<br>السالسيليك         |                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                            | 1.5                                        | 0.75  | 0     |                                                            |                                                |
| 0.366                                                      | 0.421                                      | 0.400 | 0.276 | 0                                                          | نقع البذور<br>بدقائق النانو<br>فضة (غم/لتر)    |
| 0.561                                                      | 0.647                                      | 0.590 | 0.446 | 25                                                         |                                                |
| 0.672                                                      | 0.761                                      | 0.700 | 0.556 | 50                                                         |                                                |
| 0.478                                                      | 0.543                                      | 0.514 | 0.377 | 30                                                         | نقع البذور<br>بحامض<br>السالسيليك<br>(مغم/لتر) |
| 0.560                                                      | 0.656                                      | 0.614 | 0.409 | 60                                                         |                                                |
|                                                            | 0.606                                      | 0.564 | 0.413 | متوسط السماذ العضوي<br>("الكستار")<br>غم / لتر             |                                                |
| 0.083                                                      | 0.064                                      |       |       | 0.05LSD<br>للرش بالسماذ<br>العضوي ("الكستار")<br>للتداخلات |                                                |
|                                                            | N.S                                        |       |       |                                                            |                                                |

وحدة /غم وزن طري) مقارنة مع جميع المعاملات الأخرى . السماط العضوي ( الكستار) فقد تميزت نباتات التركيز 1.5 و 0.75 غم/لتر في تحقيق تأثيراً معنوياً بلغ 1.2243 و 1.1954 ( وحدة /غم وزن طري) ، على التوالي مقارنة بنباتات بمعاملة المقارنة 1.0174 ( وحدة /غم وزن طري).

#### 4: محتوى الاوراق من Catalyase ( وحدة

/غم وزن طري)

الجدول (11) يشير الى تأثير عوامل الدراسة في محتوى الاوراق من Catalyase ، اذ حقق التركيز 50 مل/لتر من دقائق النانو فضة اعلى قيمة بلغت 1.2576 )

**جدول ( 11): تأثير بعض التراكيز من دقائق الفضة النانوية والسماذ العضوي (الكستار) و حامض السالسليليك ونداخلاتهما في محتوى الاوراق من catalyase (وحدة / غم وزن طري)**

| معاملات دقائق<br>النانو فضة<br>وحامض<br>السالسليليك         | الرش بالسماذ العضوي (الكستار) ( غم /لتر) |        |        | معاملات دقائق<br>النانو فضة<br>وحامض<br>السالسليليك |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------|
|                                                             | 1.5                                      | 0.75   | 0      |                                                     |
| متوسط النقع<br>بدقائق النانو<br>فضة<br>وحامض<br>السالسليليك | 0.9510                                   | 1.1771 | 1.1500 | 0.5257                                              |
|                                                             | 1.1833                                   | 1.2214 | 1.1843 | 1.1443                                              |
|                                                             | 1.2576                                   | 1.2986 | 1.2771 | 1.1971                                              |
|                                                             | 1.1452                                   | 1.1843 | 1.1557 | 1.0957                                              |
|                                                             | 1.1914                                   | 1.2400 | 1.2100 | 1.1243                                              |
|                                                             | 1.2243                                   | 1.1954 | 1.0174 |                                                     |
|                                                             | 0.0503                                   | 0.0390 |        |                                                     |
|                                                             |                                          | 0.0872 |        |                                                     |

التفاعلات الكيميوحيوية والانقسامات الخلوية بفعل الزيادة في الـ DNA و RNA وانزيمي البيروكسيدز والكتاليز كما ان النانو فضة يكمن دوره في خلال تحفيز التقاط الماء والتقليل من فعالية Nitrate عن طريق التحوير في حالة الاكسده والنمو والاداء في نوعية النبات عن طريق تشجيع البية تبادل وتصريف الالكترونات الخلوية مما يسبب بطء في تسرب الالكترتون وبالتالي التقليل من انتاجية Reactive oxygen species (ROS) وهذا يسبب زيادة في الانزيمات الدفاعية وسمية اقل للنبات وضرر تأكسدي اقل وتأخير بالشيخوخه (جداول 8, 9, 10, 11) (24) و (25) وبذلك يكون توافر السماذ العضوي الذي يزود النباتات بالمواد الغذائية عاملاً مساعداً في استمرارية الانقسامات والتأثير الايجابي في زيادة المؤشرات قيد الدراسة . كما يعمل السماذ العضوي وبمحتوياته من العناصر NPK والصغرى والهرمونات على تخليق التوازن الغذائي للنبات في مراحل مبكرة للنمو وبالتالي تحسين التمثيل الغذائي والنشاط الايضي وهذا بدوره يؤدي الى زيادة في مختلف الفعاليات الايضية المسؤولة عن الانقسام والاستطالة في الخلية وبالتالي الزيادة في اغلب مؤشرات النمو الخضري (26) و (27) . ان الزيادة في محتوى الاوراق من الكلوروفيل الكلي نتيجة المعاملة بالسماذ العضوي يعود الى تركيبة السماذ الحاوية على مستخلص الاعشاب البحرية والذي يعمل مع الفعاليات الحيوية والفسيولوجية للنبات على زيادة في فعالية ونشاط البناء الضوئي وبالتالي زيادة الكلوروفيل (جدول 8) (28) . كما ان زيادة محتوى النبات من الانزيمات المؤكسدة البيروكسيدز والكتاليز (جدولي 10, 11) نتيجة المعاملة بالسماذ العضوي بسبب زيادة المخزون من المواد الغذائية ومصادر الطاقة عند معاملة

تداخلات الثنائية لعوامل الدراسة اشارت الى ان التوليفات المكونة من 50 مل/لتر من دقائق النانو فضة مع 0.75 و 1.5 غم/لتر من السماذ العضوي اعطت اعلى محتوى للاوراق من انزيم الـ Catalyase بلغ 1.2771 و 1.2986 (وحدة /غم وزن طري) ، على التوالي ، الا انها لم يختلفا معنوياً عن بعض التوليفات الاخرى من المعاملات التي اشتملت نانو فضة بالتركيز 25 مل/لتر وحامض السالسليليك بتركيزيه مع السماذ العضوي ولكنها اختلفت جميعها معنوياً عن معاملة المقارنة البالغة 0.5257 (وحدة /غم وزن طري) .

### المناقشة :

ان الزيادة في ارتفاع النبات واطوال الجذور والوزنين الطري والجاف للمجموعين الخضري والجذري والزيادة في محتوى الاوراق من الكلوروفيل الكلي الواردة في الجداول من 1-7 على التوالي بفعل استعمال التركيز 50 مل/لتر من دقائق النانو فضة يؤكد اهميتها في انتاج نباتات قوية النمو وبالابعاد المذكورة للنباتات المعاملة بها التي يمكن للنباتات معها من تحمل الظروف الخارجية اصف الى ان توليفة النانو فضة مع استعمال السماذ العضوي الكستار (التداخل الثنائي) يؤكد اهمية التوليفة المذكورة حيث اعطت اعلى اقيام لصفات التداخل في معظم مؤشرات النمو مما يدل على الفعل الايجابي لتضمين العاملين معاً في الصفة . ذلك لان النانو فضة من شأنها زيادة النشاط الانزيمي وزيادة سرعة التفاعلات بفعل المساحة السطحية الهائلة لها عندما تكون في المستوى النانوي فتؤدي الى زيادة

الأكسينات وبالتالي زيادة في طول الجذر (جدول 2). بمعنى ان زيادة التفاعلات الكيميائية مع توافر السماد العضوي الكسار بالكمية المناسبة يساعد في استمرارية الانقسامات وتطور مؤشرات النمو ايجابياً كما توصل<sup>(31)</sup> من ان المركبات النانوية يتجلى دورها في تشجيع وتحسين الصفات المظهرية ومحتواها من المواد للنباتات المعاملة لها كما يعمل النانو فضة على التأثير في عمل الاثيلين ethylene وتنشيط دوره من خلال منع اتصاله مع المستقبلات في الخلايا النباتية وتأخير الشيخوخة وتحفيز النمو والتسبب في اعاده تجديد المجموع الخضري .

7- سعودي ، احمد حميد .(2012).تقييم القابلية الخزن لبدور زهرة

الشمس ( *Helianthus annuus* L.) المعاملة بحامض

الجبرليك والمخزونة بمدد خزن مختلفة . مجلة ذي قار

للبحوث الزراعية 1.(1): 301-319.

8- Černý,I.and Veverková ,A.(2012). Production parameters of Sunflower ( *Helianthus annuus* L.) influenced by weather conditions and foliar application of pentakeep - V and atonik .Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 1 (2) :887-896.

9-Li ,X. (2011). Fate of silver nanoparticles in surface water environments . Graduate Program in Civil Engineering .The Ohio State University. 1-179.

10- Mozafari,M.; Johnson,C.; Hatziantoniou ,S. and Demetzos, D.(2008). Nanoliposomes and their applications in food nanotechnology. Journal of Liposome Research, 18:309–327.

11-Monica,R. Cremonini , R. .(2009). Nanoparticles and higher plantsCaryologia. 62( 2): 161-165.

12-Fries,R.; Greßler,S.; Simkó,M.; Gázsó,A., Fiedeler,U.and Nentwich,M.(2010). Nanosilver. Institute of Technology Assessment of the Austrian Academy of Sciences,1-6.

13-Salama,H.(2012). Effects of silver nanoparticles in some crop plants, Common bean

النبات بالسماد العضوي وهذا يؤدي بالتالي الى زيادة فعالية وكفاءة الانزيمات<sup>(29)</sup> و<sup>(30)</sup> . أما دور حامض السالسلين في تحسين الصفات الخضرية اذ يعمل عند استعماله بصورة خارجية على النبات كجزئية مهمة في نقل الاشارات لغرض تنبيه النبات للتحوير في كثير من العمليات لغرض تحمل الظروف البيئية السلبية على النبات وبذلك يوفر الحماية للنبات ضد الضغوط الحيوية وغير الحيوية وبالتالي تحسن من نمو الصفات الخضرية والسبب لما للسالسلين من دور في زيادة مستوى انقسام الخلايا في داخل الانسجة الانشائية القمية والاخيرة تسبب زيادة في نمو النبات ومن ضمنها ارتفاع النبات كما يعمل على منع اكسدة

المصادر

1-Vrbničanin,S.; Božić , D.; Malidža , G.; Dušanić ,N.; Pavlović ,D.and Barac ,M.(2008). Tolerance of sunflower (*Helianthus annuus* L.) .Toimazethap . Helia, 31( 48): 85-94.

2-Harveson,R.(2011).Downy mildew of Sunflower in Nebraska.University of Nebraska –Lincoln extension ,Institute of Agriculture and Natural Resource.

3-Parmeshwar,P.; Kumar,D.; Shadakshari,Y. and Jayanthi,R.(2012). Effect of foliar application of growth regulators and chemicals on growth, flowering and vase life of ornamental sunflower genotypes (*Helianthus annuus* L.). International Journal of Agricultural Sciences,8(2): 360-363.

4- Canadian Food Inspection Agency.(2005). The Biology of(*Helianthus annuus* L.) (Sunflower). Plant Biosafety Office , 1-12.

5- Abdullah,S.and Al-Mosawi ,K.(2010). Fungi associated with seeds of Sunflower (*Helianthus annuus* L.) cultivars grown in Iraq . Phytopathologia, 57: 11–20.

6- الشماع ، ليث محمد جواد و رعد هاشم بكر . (2009) . تأثير مواعيد الزراعة في حاصل البذور والزيت لثلاثة تراكيب وراثية من زهرة الشمس .مجلة جامعة ديالى للبحوث الزراعية .كلية الزراعة (37).

- for the colorimetric estimation of deoxyribound biochem.,62(315).
- 22-Chance,B. and Maehly,A.(1955).Assay of catalyase and peroxidase . Methods Enzymol., 2:764-775.
- 23-Steel,R. and Torrie, J. (1980). Principles and Procedures of Statistics a biometrical approach, P: 633. New York. USA.
- 24- Sorooshzadeh,A.; Hazrati,S.; Oraki,H.; Govahi,M.and Ramazani,A.(2012). Foliar application of nano silver influence growth of saffron under flooding stress. Brno, Czech Republic, EU. 23- 25. 10.
- 25- Hatami,M.,and Ghorbanpour ,M.( 2013). Defense enzyme activities and biochemical variations of (*Pelargonium zonale*) in response to nanosilver application and dark storage. Turk., J. Bio., 137:1-10.
- 26- Shafeek, M.; Hassan, N.; Singer S. and EL-Greadly, N.(2013). Effect of potassium fertilizer and foliar spraying with Etherel on plant development, yield and bulb quality of onion plants (*Allium cepa* L). Journal of Applied Sciences Research, 9(2): 1140-1146.
- 27- Kashif,M.; Rizwan, K.; Khan,M. and Younis,A.(2014). Efficacy of macro and micro-nutrients as foliar application on growth and yield of( *Dahlia hybrida* L. ) (Fresco) . IJCBS. 5:6-10.
- 28-Zodape,S.; Kawarkhe ,V.;Patola,J.and Warade,A.(2008). Effect of liquid seaweed fertilizer of yield and quality of Okra (*Abelmoschus esculentus* L.). Journal of Scientific and Industrial Research.67:1115-1117.
- 29-Akila ,N. and Jeyadoss,Y.(2010). The potential of seaweed liquid fertilizer on the growth and antioxidant enhancement of (*Helianthus annuus* L.) Oriental Journal of Chemistry. 26(4): 1353-1360 .
- (*Phaseolus vulgaris* L.) and corn(*Zea mays* L.). International Research Journal of Biotechnology ,3(10) : 190-197 .
- 14-Rezvani,N.; Sorooshzadeh,A. and Farhadi,N.(2012). Effect of Nanosilver on growth of saffron in flooding stress .World Academy of Science, Engineering and Technology,6 (1) :517-522.
- 15-Aghajani,Z.; pourmeidani ,A. and Ekhtiyari,R.(2013). Effect of nanosilver on stages of plant growth and yield and composition of essential oil of (*Thymus kotschyanus* Boiss. & Hohen) . African Journal of Agricultural Research .8(8) :707-710.
- 16- عباس ، حسن علي ، حسين عبيد خضير وعبد الستار جبار حسين .(2008).تأثير السماد النتروجيني ومسافات الزراعة في بعض الصفات المظهرية وحاصل زهرة الشمس .مجلة ام مسلمة للعلوم . 5 (2):188-192.
- 17- كريم ، عامر نعمة ، عامر حبيب حمزة وعادل فاضل حدادي . (2012). تأثير معاملات مختلفة من الاسمدة العضوية والحيوية والكيميائية في نمو وحاصل زهرة الشمس ( *Helianthus annuus* L.) . مجلة الفرات للعلوم الزراعية -4 (2) :137-130.
- 18- Dawood ,M.; Sadak ,M .and Hozayen ,M.(2012). Physiological role of salicylic acid in improving performance, yield and some biochemical aspects of Sunflower plant grown under newly reclaimed sandy soil. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 6(4): 82-89.
- 19- Ebrahimian ,E. and Bybordi,A.(2011). Effect of iron foliar fertilization on growth, seed and oil yield of sunflower grown under different irrigation regimes. Middle-East Journal of Scientific Research, 9 (5): 621-627.
- 20-ISTA. (1985). International rules for seed testing. Seed Sci. and Technol., 13: 299–355.
- 21-Burton,A.(1956).A study of the condition and mechanism of the diphenyl amine reaction

- 31-Laware,S. and Raskar, S.(2014) . Influence of zinc oxide nanoparticles on growth, flowering and seed productivity in Onion *Int.J.Curr.Microbiol.App.Sci* .,3(7) :874-881.
- 30- Abdalla,M.(2013). The potential of (*Moringa oleifera*) extract as a biostimulant in enhancing the growth, biochemical and hormonal contents in rocket (*Eruca vesicaria subsp. sativa*) plants. *Int., J. Plant Physiol., Biochem.*, 5:342-49.



Laboratory studies on the effect of nano silver particles, organic fertilizer (Algastar ) and salicylic acid on vegetative growth parameters and oxidizing enzymes in Sunflower(*Helianthus annuus* L.) cv. Viki

Receved :18/1/2015

Accepted :15/3/2015

Yaseen, A. A.M.

\*Mazeil, H. Wasan

Wh mg2000@yahoo.com

**\*Department of Biolgy/ College of Education/ Al – Qadisiya University**

**Abstract:**

The present experiment was perfomed from the period of 28/10/2013 until 4/12/2013 . In this experiment Sunflower seeds was soaked in 25 , 50 ml/ L nanosilver and 30 ,60 mg/L of salicylic acid and the resulted plants were sprayed by 0.75 , 1.5 g/L (Algastar) in addition to the control treatment during the third leaf stage to determine its impact on growth and shoot content of DNA , RNA and leaves content of oxidizing enzyme peroxidase and catalyase . CRD design was used in this combination of some nanosilver, organic fertilizer (Algastar) and salicylic acid with 15 treatments and 7 replications.This obtained results revealed as the following:Seeds soaking with 50 ml/L of nanosilver gave the highest positive effects in all vegetative growth parameters and the vegetative content of DNA,RNA and oxidizing enzymes (peroxidase and catalyase).while the effect of sprayed the vegetative growth with 1.5 g/L organic fertilizer showed significant increasing in all studied growth parameters . The combination of 50 ml/L from nanosilver with 1.5g/L of organic fertilizer revealed positive effect in plant height ,root length , , fresh and dry weight of shoot and root ,leaf content of total chlorophyll and,DNA,RNA and catalyase ,this combination did not have any significant effect on the dry weight of shoot and root and peroxidase .

**Keywords:** Salicylic acid , Peroxidase, Catalyase, Nanosilver

---

\*The research part of Ph.D. Dissertation of the second researcher